


Behandeling afstellen met RAAS inhibitoren in honden met glomerulopathie



Het doel van behandeling is om de eiwit/creatinine ratio lager dan 0.5 te krijgen (wat niet steeds haalbaar is) en/of minder dan 50% van de uitgangswaarde voor de start van de behandeling

Afkortingen

ACEi = ACE inhibitor (Enalapril, Benazepril, Ramipiril, Imidapril)

ARB = angiotensine receptor blocker (Telmisartan, Losartan)

Dosissen

Benazepril en Enalapril

- Startdosis: 0.5 mg/kg/dag
- Verhoog met stappen van 0.5 mg/kg/dag
- Maximum dosis: 2 mg/kg/dag (mag ook 2x/dag gegeven worden)

Ramipiril

- Startdosis: 0.125 mg/kg/dag
- Verhoog met stappen van 0.125 mg/kg/dag
- Maximum dosis: 0.5 mg/kg/dag (wordt meestal 1 keer per dag gegeven)

Imidapril

- Startdosis: 0.25 mg/kg/dag
- Verhoog met stappen van 0.25 mg/kg/dag
- Maximum dosis: 5 mg/kg/dag (wordt meestal 1 keer per dag gegeven)

Telmisartan

- Startdosis: 1 mg/kg/dag
- Verhoog met stappen van 0.5 mg/kg/dag
- Maximum dosis: 2 mg/kg/dag

Losartan

- Startdosis: 0.125 mg/kg/dag in honden met azotemie of 0.5 mg/kg/dag indien geen azotemie aanwezig
- Verhoog met stappen van 0.25 mg/kg/dag
- Maximum dosis: 1 mg/kg/dag wanneer geen azotemie aanwezig is

Referentie:

Brown S et al. Consensus recommendations for standard therapy of glomerular disease in dogs. J Vet Intern Med 2013;27:S27-S43